



# FORTBILDUNGSPUNKTE ●●●

Lösungsbogen AG/201/4

CME-Modul:

**Karzinoid-Syndrom frühzeitig erkennen – der Entwicklung einer Karzinoid-Herzerkrankung vorbeugen**

CME-Punkte:

4

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

16. Juni 2020

Link zur Anmeldung:

[https://cme.medlearning.de/novartisoncology/karzinoid\\_syndrom\\_rez/index.htm](https://cme.medlearning.de/novartisoncology/karzinoid_syndrom_rez/index.htm)

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Aussage zur Diagnostik neuroendokriner Tumoren ist richtig?**

Antwort: **Bei vielen NET ist Chromogranin A im Serum erhöht, sodass dieser Marker zur Verlaufskontrolle genutzt werden kann**

Frage: **Welches Hormonsyndrom liegt laut den Daten des deutschen NET-Registers am häufigsten vor?**

Antwort: **Karzinoid-Syndrom**

Frage: **Welche Aussage zum Management und zur Nachsorge von Patienten mit Karzinoid-Syndrom und Herzerkrankung ist falsch?**

Antwort: **Abhängig von der klinischen Situation sollte ein Follow-up alle zwei Jahre erfolgen**

Frage: **Was zählt nicht zu den klassischen Leitsymptomen bei Patienten mit einem Karzinoid-Syndrom?**

Antwort: **Refluxbeschwerden**

Frage: **Welche Aussage zur Therapie des Karzinoid-Syndroms und der Herzerkrankung ist richtig?**

Antwort: **Durch die Gabe von Somatostatinanaloga (SSA) wie Octreotid oder Lanreotid kann der Hormonexzess aktiver NET gehemmt werden**

Frage: **Welche Aussage zur Diagnostik bei Patienten mit Karzinoid-Syndrom und Herzerkrankung ist falsch?**

Antwort: **Zur weiteren Abklärung der Erkrankung wird eine Bestimmung von Serotonin im Plasma empfohlen**

Frage: **Welche Aussage zu neuroendokrinen Tumoren (NET) ist falsch?**

Antwort: **In den letzten Jahrzehnten konnte eine abnehmende Inzidenz beobachtet werden**

Frage: **Welche Aussage zur Pathophysiologie der Karzinoid-Herzerkrankung ist falsch?**

Antwort: **In etwa 90 % der Fälle ist die linke Herzhälfte von der vermehrten Bindegewebsbildung betroffen**

Frage: **Welcher Proliferationsmarker wird bei neuroendokrinen Tumoren hauptsächlich genutzt?**

Antwort: **Ki-67**

Frage: **Das mittlere Überleben von Patienten mit Karzinoid-Syndrom lag im Jahr 1993 bei etwa 4,6 Jahren und wurde durch das gleichzeitige Vorliegen einer Karzinoid-Herzerkrankung gesenkt auf...**

Antwort: **1,6 Jahre**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.